

RELEVANCE TRIAL

10 yıllık Final Analizi

Faz 3 Randomize Asik Etiket

$n=1030$ Tedavi nolf ile cene Fahlw lebray
(Ged 1-3.)

R^2 (Lend'id mid - Rituximab. VS Rituximab - Kemo.



Rituximab isame

Amaç: Kemoterapiye yaklaşım gerektirir e, degenir?

R^2

R-Kemo

(Primary point)

PFS

(Median)

110.6 Ay

10 yıllık PFS → %46.4

102.8 Ay

%46.6

ISSDIGGER

[Sogkelim acortari
yok
iki kolded
ayn]

OS median

ULAS ANADOLU

10 yıllık OS → %82.4

%81.1

En kritik profil bulup - POP24 yeni POD14 &
te

FLUPI, Yaş, bulk hastalık → Fork YOK

R^2 ve R_{Kemo}
Forketme

Güvenli
%99 hasta AE yapar. Grade 5 - %1.5
Chemo free Toksik yok → YANLI.

Sekonder malignite → $\frac{100}{711} / 2.11$

⇒ R2 ve R kemod.
%15.6 %11.9

ölm Nedeni Lentiform progresyon
* Sekonder malignite

Lentiform kemoterapi

R2 deke 141 → **HAYIR ESPEĞER**

Kemoterapiye direnç → YANLI hızlı yakt geçen
Bulky hastada hasta farklı.

Toksikite düşük → Değil sadece farklı toksikite.

R2

- KT istenmeyen hasta
- Frail / Komorbid
- Uzun vadede yaşam kalitesizdir

Terah et)

Chemo

- Yüksek Tm yoku hızlı yakt. 141/144
- Klinik eşgref baran
- Doku korfu.

Terah et

PRIMA → Pdrenis değeri

GALLIUM → obliterant edici

RELEVANCE → Kemfree statusunu değeri.